





Consiste en la aplicación de un conjunto de instrumentos seleccionados para detectar posibles cambios en la persona con otras discapacidades intelectuales (no síndrome de Down) e iniciar una derivación para el diagnóstico idóneo.

FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

- **Personas con discapacidad intelectual (no síndrome de Down):**
 - **CAMCOG-DS** que forma parte del [CAMDEX-DS. Prueba de Exploración Cambridge para la Valoración de los Trastornos Mentales en adultos con Síndrome de Down o con Discapacidad Intelectual \(teaediciones.com\)](#) Sección 2. Evaluación del/a paciente. **Parte II Examen Cognitivo (CAMCOG-DS)**. Herramienta estructurada y estandarizada que permite la evaluación de las formas más frecuentes de demencia y de otros trastornos mentales y físicos presentes en personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual de otra etiología.
 - [MCRT - Modified Cued Recall Test](#): El test de recuerdo verbal selectivo es un procedimiento utilizado para la evaluación de la memoria episódica y el aprendizaje verbal. La prueba aporta datos sobre el recuerdo libre de imágenes y el recuerdo facilitado mediante pistas.
- **Familiares u otro/a referente de convivencia:**
 - **CAMDEX-DS**. Prueba de Exploración CAMBRIDGE para la valoración de los trastornos mentales en personas adultas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual. **Sección 1. Entrevista a la persona informante**. Consta de Entrevista familiar única (CAMDEX – DS) y repetición de la misma si se detectan cambios.
- **Profesionales de referencia de la persona usuaria con discapacidad intelectual:**
 - Registro de observación para profesionales (ROP): herramienta profesional interna para la evaluación de cambios significativos en la persona a través de procesos observacionales. Una puntuación de 0 indicaría ausencia de cambios observables. El mayor incremento numérico, mayor incidencia de cambios observados. Instrumento de elaboración propia.

PERIODICIDAD DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

EDAD	CAMCOG-DS	MCRT	ROP	CAMDEX_DS
 41 años	PRIMERA MEDICIÓN		*	BASAL
 51 años	SEGUNDA MEDICIÓN		*	×
 56 años	TERCERA MEDICIÓN		BASAL	×
 Sigüientes mediciones	2 AÑOS ● ●	2 AÑOS ● ●	2 AÑOS ● ●	SI HAY SIGNOS DE ALERTA

* Se recomienda el ROP en menores de 56 años, sobre todo cuando no hay posibilidad de aplicar CAMCOG-DS y MCRT. En este caso la periodicidad es la misma que en las mencionadas pruebas.

BIBLIOGRAFÍA

- Guía [“El proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual”](#). Down Galicia

